BoluFeed

Repro Plus Prepalac

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kühe in Form eines Bolus zur langsamen Wirkstoff-freisetzung.

Aliment diététique Bolus à diffusion dans le rumen pour vaches laitières.

10 Boli á **60** g

BoluFeed
Repro Plus Prepalac

Hinweise für die ordnungsgemäße Verwendung. Anwendung: Das BoluFeed wird mit einem passenden Eingeber (Applikator) oral gegeben. Sie dürfen nicht bei liegenden Rindern angewendet werden. Zerbrochenes oder beschädigtes BoluFeed nicht mehr verwenden. Folgende Anweisungen beachten:



1. Vor dem Gebrauch den Applikator reinigen, desinfizieren und ausspülen. Den Bolus sorgfältig in den zylinderförmigen Teil des Applikators einlegen.
2. Das Maul des Tieres öffnen und den Applikator sorgfältig und behutsam in Richtung des oberen Bereichs der Maulhöhle führen. Während der gesamten Anwendung den Kopf des Tieres mit gestrecktem Hals fixieren.
3. Den Applikator langsam bis hinter die Zunge weiterschieben, ohne Kraft auszuüben. Mit einem oder 2 Fingern der freien Hand in das Maul greifen, um die korrekte Lage zu kontrollieren.
4. Wenn der Applikator richtig eingeführt ist, drücken Sie den Knopf, um den Bolus zu verabreichen. Reagiert das Tier mit Abwehrreaktionen, ist der Applikator nicht korrekt positioniert. Applikator entfernen und erneut einführen.

Mode d'emploi :A donner avec un applicateur adapté



1. Nettoyer, désinfecter et rincer l'applicateur avant la manipulation de chaque lot d'animaux. Introduire avec précaution les bolus dans le cylindre de l'applicateur.
2. Ouvrir la gueule de l'animal et introduire avec précaution l'applicateur en le glissant vers le plafond de la cavité buccale. Pendant toute l'opération, la tête de l'animal sera mainte-nue étendue avec l'encolure droite.
3. Continuer à insérer l'applicateurdélicatement sans forcer. Avec un ou deux doigts de la main libre, caresser l'intérieur de la joue pour faciliter l'opération.
4. Quand l'applicateur est bien positionné, appuyer sur le poussoir pour libérer les bolus. S'il subsiste une résistance lors de la poussée, la position n'est pas bonne, retirer l'applicateur et recommencer l'opération. Retirer avec précaution l'applicateur.

AGRI SERVICE JEUKEN B.V.
HEERBAAN 114 · 6566 ET MILLINGEN A/D RIJN (NL)
TELEFON: 0031 481433661 · FAX 0031 481432075 · MOBIL: 0031 653195804
www.agriservicejeuken.nl · info@agriservicejeuken.nl

Mode d'emploi

Bovins adultes : Appliquer 1 bolus par animal directement par voie orale.
Renouveler l'opération 3 jours plus tard si nécessaire.
A utiliser de préférence avant (lot et date) : voir ci contre ou sur l'emballage.

Recommandations

A distribuer en début de la lactation et pendant la période de 3 à 6 semaines après le vêlage pour le risque de cétose. Megabric Prepalac est recommandé lors des débuts de lactation difficile, les baisses d'ingestion ou de production. Veillez à maintenir un bon équilibre général de la ration.

Objectif nutritionnel :
Réduction du risque de cétose chez la vache laitière.

Composition :
Oxyde de magnésium, amidon de maïs hydrolysé.

Additifs pour 1 bolus de 60 g. :

Oligo-éléments
E5 Manganèse (oxyde de manganèse) 1 550 mg
E3 Cobalt (carbonate de cobalt monohydraté) . . . . . 25 mg

Vitamines
Vitamine PP (acide nicotinique, niacine) . . . . . 36 250 mg

Garanties par bolus :
Constituants analytiques

Protéine brute (%)	44
Cellulose brute (%)	0,1
Matières grasses brutes (%)	2
Cendres brutes (%)	21
Sodium (%)	0,01
Magnésium (%)	6

Dosierung: 2 Boli je Tier und Anwendung.

Milchkühe: 2 Boli, einen Monat nach der Abkalbung zur Verbesserung der Fruchtbarkeit.

Kalbinnen: 2 Boli, 1 Monat vor der ersten Besamung

Mutterkühe und Kalbinnen: 2 Boli, 1 Monat vor der Besamung

Wirkungsweise:
Vitamine und Mineralstoffe zur Unterstützung der Reproduktionsleistung. Der Bolus löst sich innerhalb von 2- 3 Tagen nach der Eingabe auf.

Warnhinweise: Nicht für festliegenden Kühe geeignet. Gebrauchsanweisungen (oder Produktinformationen) sorgfältig beachten.

Chargennummer und Mindesthaltbarkeit: (auf der Box)

Ernährungszweck :
Zur Brunstvorbereitung der Reproduktionsleistung (Fruchtbarkeit).

Zusammensetzung:
Dicalciumphosphat, Maisstärke aufgeschlossen.

Analytische Bestandteile:

Rohprotein	18,9 %
Rohfett	4 %
Rohfasern	< 1 %
Rohasche	40 %
Calcium	7,5 %
Phosphor	4 %

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe Vitaminvormischung	pro 2 Boli:	per kg:
Vitamin A (E672)	1 500 000 IE	12 500 000 IE
3a700 Vitamin E	5 000 mg	41 660 mg
Vitamin PP (Niacin)	12 000 mg	100 000 mg
Spurenelemente:		
Zink Aminosäure-Chelat-Hydrat (E6)	4 000 mg	33 330 mg
Mangan Aminosäure-Chelat-Hydrat (E5)	1 500 mg	12 500 mg
Kupfer Aminosäure-Chelat-Hydrat (E4)	1 500 mg	12 500 mg
Jod Calciumjodat (E2)	100 mg	833 mg
Kobalt(basisches Kobalt-(II)-Carbonat) (E3	50 mg	416 mg
Selen Natriumselenit (E8)	10 mg	83 mg

BoluFeed

Repro Plus Prepalac

10 Boli á **60** g

Feed Safety GMP+ Assurance